

Zentrale Aufnahmeprüfung 2013 für die HMS des Kantons Zürich

Mathematik 2./3. Sekundarschule Herkömmliches Lehrmittel

Korrekturrichtlinien und Resultate

Allgemeine Hinweise zur Korrektur

- Es werden nur ganze Punkte verteilt.
- Durchgestrichenes wird nicht bewertet.
- Um die Verhältnismässigkeit bei der Punktevergabe zu wahren, gehen keine Punkte verlustig bei:
 - vergessenen Einheitsangaben,
 - Rundungsfehlern (z. B. Abrunden statt Aufrunden oder Weiterrechnen mit gerundeten Zwischenresultaten), oder bei
 - fehlenden Antwortsätzen.
- Bei unerwarteten Lösungswegen und Ansätzen sollen Teilpunkte sinngemäss bzw. mit gesundem Menschenverstand vergeben werden.
- Numerische Resultate sind, wo nichts anderes vermerkt ist, in beliebiger Form zu akzeptieren (beispielsweise auch ungekürzte Brüche).

1. 6 Punkte

a) $6b - 8a - 6a + 15b = 21b - 14a$

2 Punkte
 1 Punkt Vorzeichen falsch
 $-9b - 14a$
 1 Punkt $6b - 8a - 6a + 15b$

b) $\sqrt{8p^2 - 8p + 8p^2 + 2p + 6p} = \sqrt{16p^2} = 4p$

2 Punkte
 1 Punkt $\sqrt{16p^2}$

c) $\frac{7s}{4} - \frac{5s}{6} = \frac{21s - 10s}{12} = \frac{11s}{12}$,

$\frac{7s}{4} + \frac{5s}{6} = \frac{21s + 10s}{12} = \frac{31s}{12}$

$\frac{11s}{12} : \frac{31s}{12} = \frac{11}{31}$

2 Punkte
 1 Punkt Zähler oder Nenner

2. 4 Punkte

a) $2(2x - 3) - 5(2x - 1) = 30, 4x - 6 - 10x + 5 = 30,$

$-6x - 1 = 30, x = -\frac{31}{6}$

2 Punkte
 pro Fehler - 1 P

b) $12 - 5x > 4x - 2x + 21, -9 > 7x, x < -\frac{9}{7}$

$L = \{-2, -3, -4, -5, \dots\}$

2 Punkte
 1 Punkt $x < -\frac{9}{7}$
 1 Punkt richtige
 Lösungsmenge aus $x > -\frac{9}{7}$:

3. 6 Punkte

a) $68x + 950 = 56(x + 7) + 930, 68x + 950 = 56x + 1322,$
 $12x = 372, x = 31$ Ursprünglich haben sich 31 angemeldet.
 Schlussendlich sind es **38 Personen**

3 Punkte
 1 Punkt: Gleichung
 2 Punkte : 31 Pers.

b) $\frac{6}{5}(x + 200) - 30 = 4536, \frac{6}{5}x = 4326, x = 3605$

3 Punkte
 2 Punkte: Gleichung
 3 Punkte: Lösung ohne
 Gleichung via 4566, 3805, 3605
 2 Punkte: Nur Idee:
 $4566 : 1.2 = 3805$

4. 6 Punkte

a) Mindestens $43+17 = 60$,

2 Punkte, nur ein Resultat 1 Punkt

Höchstens: $16 + 43 + 29 + 17 = 105$

1 Punkt ohne die 17 sind es 43 resp. 88


b₁) 5 nur Sch, **8** Sch & F & V, **0** Sch & F,

$3 = 16 - 8 - 5$ nur Sch & V also **11** Sch&V

2 Punkte, 1 Punkt für 0 Sch & F

b₂) $25 + 11 + 5 + 21 + 17 = 79$

2 Punkte, 1 Punkt für 7 nur F&V **oder** 14 nur F



5. 4 Punkte

b) Bergaufwärts 1 h, talwärts $2/3$ h

Geschwindigkeit: $v = \frac{s}{t} = \frac{50}{5/3} = 30 \text{ km/h}$

2 Punkte

1 Punkt Idee Weg Total : Zeit Total

b) $v_{\text{hin}} = \frac{27 \text{ km}}{2.25 \text{ h}} = 12 \text{ km/h}$, $t_{\text{rück}} = \frac{27 \text{ km}}{15 \text{ km/h}} = 1.8 \text{ h}$,

D.h. 1h 48 Min. Sie muss um **15:12** abfahren!

2 Punkte

1 Punkt 1.8 h

6. 5 Punkte

a) Adria 560: 1200, Camp 480: 1190, Van 500: 1380,

Camp 480 ist am billigsten.

2 Punkte

2 Beträge richtig 1 P

b) (1) $750 + 90t < 350 + 120t$, $-30t < -400$, $t > 13.33$,

ab 14 Tage ist Van 500 billiger als Camp 480

Vergleich mit Adria 560:

(2) $750 + 90t < 150 + 150t$, $-60t < -600$, $t > 10$

ab 11 Tagen ist Van 500 billiger als Adria 560.

3 Punkte für 14 Tage (= Lös (1))

2 Punkte Ungleichung (1) richtig.

2 Punkte für 11 Tage (= Lös (2))

1 Punkt Ungleichung (2) richtig.

3 Punkte Lösung mit vollständiger Tabelle

	Camp	Van
10 Tage	1550	1650
11 Tage	1670	1740
12 Tage	1790	1830
13 Tage	1910	1920
14 Tage	2030	2010

